

# HEXACYL® Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Wirkstoffe: *Sulfur D4, Lycopodium Ø, Berberis Ø*

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss HEXACYL® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **HEXACYL®** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **HEXACYL®** beachten?
3. Wie ist **HEXACYL®** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **HEXACYL®** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST HEXACYL® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

### **Stoff- und Indikationsgruppe:**

HEXACYL® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungs- und Harnorgane.

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei funktionellen Störungen von Leber, Galle und Nieren.

**Hinweis:** Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HEXACYL® BEACHTEN?

### **HEXACYL® darf nicht eingenommen werden:**

Nicht anwenden bei Alkoholkranken.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von HEXACYL® ist erforderlich:**

HEXACYL® ist bei Leberkranken erst nach Rücksprache mit dem Arzt anzuwenden.

Geben Sie HEXACYL® Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt aufgrund des Alkoholgehaltes, und da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

### **Bei Einnahme von HEXACYL® mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von HEXACYL® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Hexacyl® auch wegen des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von HEXACYL®:**

Dieses Arzneimittel enthält 59,9 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

## 3. WIE IST HEXACYL® ANZUWENDEN?

Nehmen Sie HEXACYL® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12x täglich, je 5 - 10 Tropfen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 x täglich je 5 Tropfen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Art der Anwendung:**

Nehmen Sie die Tropfen in etwas Trinkwasser ein.

### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von HEXACYL® zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge HEXACYL® eingenommen haben, als Sie sollten:**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden aufgenommen:

10 ml Flasche = 5,5g Alkohol

30 ml Flasche = 16,4g Alkohol

100 ml Flasche = 54,5g Alkohol

**Wenn Sie die Einnahme von HEXACYL® vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von HEXACYL® abbrechen:**

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann HEXACYL® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

**Hinweis:** Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST HEXACYL® AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter [www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung).

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was HEXACYL® enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

10 g (entspr. 10,99 ml) Mischung enthält:	Sulfur Dil. D4	3,00 g
	Lycopodium Ø	0,10 g
	Berberis Ø	0,05 g

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 43% (m/m), gereinigtes Wasser

1 ml entspricht 40 Tropfen.

**Wie HEXACYL® aussieht und Inhalt der Packung:**

10 ml, 30 ml und 100 ml Mischung zum Einnehmen.

Eigenschaften: grünlich-gelbe, klare Flüssigkeit



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck**  
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya  
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0  
Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291  
E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 07 / 2015