

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

QUENTAKEHL® D5 Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff: *Penicillium glabrum* e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 aquos.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Das gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist QUENTAKEHL® D5 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von QUENTAKEHL® D5 beachten?
3. Wie ist QUENTAKEHL® D5 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist QUENTAKEHL® D5 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist QUENTAKEHL® D5 und wofür wird es angewendet?

QUENTAKEHL® D5 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von QUENTAKEHL® D5 beachten?

QUENTAKEHL® D5 darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen *Penicillium glabrum* sind
- bei Kindern unter 12 Jahren
- bei Autoimmunerkrankungen
- bei Schwangerschaft und Stillzeit

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie QUENTAKEHL® D5 anwenden.

Hinweis an den Anwender:

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kinder

Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

Anwendung von QUENTAKEHL® D5 zusammen mit anderen Arzneimitteln

Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von QUENTAKEHL® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

QUENTAKEHL® D5 sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden, da hierzu keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

QUENTAKEHL® D5 enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 1 ml, d.h., es ist nahezu "natriumfrei".



3. Wie ist QUENTAKEHL® D5 anzuwenden?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts Anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!
Soweit nicht anders verordnet injizieren Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2mal wöchentlich 1 Ampulle zu 1 ml subcutan.

Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte QUENTAKEHL® D5 abgesetzt werden. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet / eingenommen werden. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund des Gehaltes von QUENTAKEHL® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Penicillium glabrum* ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

5. Wie ist QUENTAKEHL® D5 aufzubewahren?

Bitte bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum ist auf der Ampulle und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Die nach der Anwendung in der Ampulle verbleibende Restmenge ist zu verwerfen.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was QUENTAKEHL® D5 enthält

Der Wirkstoff ist: 1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: 1 ml *Penicillium glabrum* e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 aquos. (Lsg. D1 mit Wasser für Injektionszwecke nach HAB, Vorschrift 5b).

Wie QUENTAKEHL® D5 aussieht und Inhalt der Packung

1, 10 bzw. 50 Ampulle(n) zu 1 ml flüssiger Verdünnung zur s.c. Injektion.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck

GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0

Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291

E-Mail: info@sanum.com

Reg.-Nr.: 228.00.01

Apothekenpflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2018

Hinweis: Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **QUENTAKEHL®** Kapseln, Flüssige Verdünnung und Zäpfchen zur Verfügung.

