

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SANUKEHL® Pseu D6 Flüssige Verdünnung Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff: Pseudomonas aeruginosa extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber *Pseudomonas aeruginosa*
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 2 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel können die Wirkung von SANUKEHL® Pseu D6 beeinflussen?

Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von **SANUKEHL® Pseu D6** beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von vier Wochen einzuhalten.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie SANUKEHL® Pseu D6 anwenden?

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Soweit nicht anders verordnet, werden bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5 - 10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.

Kinder ab 6 bis unter 12 Jahre: Soweit nicht anders verordnet, werden bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5 Tropfen alle 12 - 24 Stunden eingenommen; bei chronischen Verlaufsformen werden 5 Tropfen alle zwei Tage eingenommen.

SANUKEHL® Pseu D6 kann auch in die Haut eingerieben werden; bei dieser Art der Anwendung wird wie folgt dosiert:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Alle 1 bis 2 Tage werden 5 - 10 Tropfen in die Ellenbeugen oder um den Nabel herum eingerieben.

Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren: Alle 1 bis 2 Tage werden 5 Tropfen in die Ellenbeugen oder um den Nabel herum eingerieben.

Kinder ab 2 bis unter 6 Jahre: Alle 1 bis 2 Tage werden höchstens 5 Tropfen in die Ellenbeugen oder um den Nabel herum eingerieben. Die allgemeine Empfehlung zur Dosierung ist 1 Tropfen pro Lebensjahr.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.





Wie lange sollten Sie **SANUKEHL® Pseu D6** anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte **SANUKEHL® Pseu D6** abgesetzt werden. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **SANUKEHL® Pseu D6** auftreten?

Aufgrund des Gehaltes von **SANUKEHL® Pseu D6** an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Pseudomonas aeruginosa* ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmako-vigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel nicht über 25 °C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Verfalldatum ist auf der Flasche und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! - Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. - Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. - Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten:
Wirkstoff: 10 ml **Pseudomonas aeruginosa extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6** (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).
1 ml entspricht 22 Tropfen.

Darreichungsform und Inhalt:

10 ml / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben in die Haut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:



SANUM-Kehlbeck

GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0
Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291
E-Mail: info@sanum.com

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 29042.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Gebrauchsinformation: 09 / 2017



Trennung an der abstehenden Lasche anlassen und runderum abziehen.



Weißle Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anlassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammendrücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropfflasche.

