

Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel

VETOKEHL® BOV D5

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

Pferd, Rind, Hund, Katze, Hühner, kleine Nagetiere, Ziervögel, Puten, Tauben, Enten, Gänse, Wachteln



Wirkstoff:

Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulae (lyophil., steril.) D5 Dil. aquos.

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wechselwirkungen: Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn VETOKEHL® Bov D5 gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Zieltierarten: Pferd, Rind, Hund, Katze, Hühner, kleine Nagetiere, Ziervögel, Puten, Tauben, Enten, Gänse, Wachteln

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

bei Pferden und Rindern:

2 x wöchentlich 1 - 2 ml

bei Fohlen und Kälbern:

2 x wöchentlich 1 ml

bei Hunden, Katzen, Hühnern, Puten,

Gänsen, Enten, Tauben, Wachteln:

1 x wöchentlich 1 ml

bei Ziervögeln und kleinen Nagetieren:

1 x wöchentlich 0,5 ml

subkutan injizieren.

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden. Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung: Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.



Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode: Zur Verträglichkeit von **VETOKEHL® Bov D5** bei trächtigen und laktierenden Tieren sowie bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation bzw. während der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Kalb, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Tauben, Wachteln:

Essbares Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Eier: 0 Tage

Besondere Lagerhinweise:

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25° C!

Das Verfalldatum ist auf der Ampulle und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 31924.00.00

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 1 ml enthält:

Wirkstoff:

1 ml Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulae (lyophil., steril.) D5 Dil. aquos. (HAB, Vorschriften 5b, 11).

Inhalt:

10 / 50 Ampullen zu 1 ml flüssige Verdünnung zur s.c. Injektion



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG

Hasseler Steinweg 9 · D-27318 Hoya

Datum der Gebrauchsinformation: 03 / 2020

Hinweis:

Zur weiteren Anwendung steht Ihnen **VETOKEHL® Bov** Flüssige Verdünnung zur Verfügung.